種

痘

新

書

猶為 無 天 悉移為海人道。然為為為一個人為一個人為一個人的人。然為一個人的人。 私無 洛 孫 張校行性地 乃淡 痾 古蓝

酸 治 肝 猛 攻 憑 疽 日 疹 症 雏 救 文 况 派

力 旣

深 術 以 天下故 應

面救術生 天在以此 拜為不收鄉 必如後不之 那处願世可心 母一此 以也 及器 書 之一天秘 世天

基管以外 建管以外 位士玉 其道是 民相之上先生之人

之為夫 を からない からしま 汤 好筋盈盈但墨守一次通行及发生 變率由舊 若 創 新 岐击 章族 之有 耳目科 陳 桐 泥船 室肴 因 一心 13 即 巴 俗 得 杓 独 耳 雨 即以 狗 痘 調 電 2 不見 2

舊草而論 加當天行應疾人皆性不力則宜傳之於所不欲以之所不能與我而不欲以之所不被其決而不 就其決而不 就其決而不 就其決而不 就其決而不 就 其 決而不 就 其 決 而不 就 其 決 而不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 決 而 不 就 其 於 而 不 就 其 於 而 不 就 其 於 而 不 就 其 於 而 不 就 其 於 公 之 。 庭之于不庭

至而授之以病也仁治将安忍平余三不然症乃先天之毒方陰陽交感之以病也仁治将安忍平余一,并行变氣之感後未了,并行变氣之感後未了

沙 回生 v×, 不順又或付之 胡扇 温 于無事之日以住苗而引胎毒胡保安于未危者其功為甚知 無反歸咎于天定之作孽此会 温凉和解之不明既不能必 横面症自 於 余死

父書遍 先 仁 苦 生之 2 路痘症 教 恩 幼 之善 日夏勤 種痘箕裘已経數代 讀 書不盡 幾及萬人用數十 於治痘之 耳余祖 一信其書 師

公耳目云 一起年學力悉與於書非敢曰創土 一之千些以補慈幼之術而新收世 一之千些以補慈幼之術而新收世 一之千些以補慈幼之術而新收世 一之千些以補慈幼之術而新收世 一之千世以補慈幼之術而新收世 一之千世以補慈幼之術而新收世 一之千世以補慈幼之術而新收世 生矣

114 寧 一陽張 羧遜

簡是首明藥性藥性若熟則左宜右有隨近立方四時四域 學者質之知其日當用生其日當用就氣藥是於前某藥是 臟腑症盡程干皮屑觀其外即可知其內是又不必深水子 望聞問切監察之要缺 有因時而用者故詐辨前後之所是與先後生熟之所宜令 脉之可應且痘出則肌肉浮腫而又難于切脉况痘毒雕肉 於後庶不至於有誤此 百無完效故首卷必先樂性兒痘症之發限日限時而藥支 **脉也故于脉訣客而不詳欲學者紹心于望聞與問而已** 而不可也但痘症灸出小見旣無

書中分順險與过順者不必治逆者不可治似減数治平陰 連に議論或出下 し之化裁或因乎前賢之放此蓋往前 方書極備于往昔余當傳覽名書採取許方留心數 痘也孰知不必治者而妄治之正恐競投藥與症之輕者**的** 所得家傳秘訊悉呈丁書以傳天下 擇其效者而仔之其不效者而去之更雲莊宇內遍訪高明 無妨係是法度以為學者之則此為述為作無罪直相發明 不利之論不敢復增一字必傳為萬代之談剖斯不厭詳明

製造が計 駅と別 書分仁義禮智信五部以即天地之五行 治症要聚悉是於前令學者依方面製儿散以倘然等 **罄中阿照非取其交之妙辭之雅也是取其理之確議之當** 爲于古不磨之近該然後與登而直圍至于極點之處亦為 済學者切宜露記慎勿泛泛讀過不為機能致**到**余少 其餘治病諸方許賦于後合學者然考釋取以搏擊方 話而分之使學者固無思治之弊亦免管見之誠也。 路襲之言其或三角图者或襲為武標方標症原乙致於

為 怂 仁部 指南赋 金鏡駅 薬主族 一經絡 這原城 節制験 用藥 騰朋虛寒見症 權宜賦 脚的藥品

輕症歌 死症队 汀丁論 重義調治法 表虛調治法 四時調治法 表熱調治法 死真復生十症 重症队 新血論 治症宜避谷方水上 裏就調治法 裏虚調治 遊症歌 辨短吉凶 表與調治法

四卷 を記する 論愛敬神 解脈法 起型法 澤苗秘訣 **倘要在散晰用 施西秋訣** 開主家怨咎醫人 調理法三條 為神位法 解增法 論境宜種 論宜避線 先觀小見形色然後施茜秘訣 論症後日切 辨甫吉凶 起堕總許 二十四厘岩

初熱好症此 **远近日**期 八門看痘法 挫厥 吐黄水 ル黑 亂語 發潤 쌿漏 頭捕 十指冷 **吐清水** 幣語 痘症使變 閉箱 心胸崩 目削 足冷 二日調治法別推拿法院經 腹州 吐濃痰 泄紅. 咳嗽 腰捅 將然時法 嘔吐 口渴 吐臭痰 船总 泄白 뢷桶 能嘔

恶 浦部 面阁 辨及襟不拘部位 諸失加 二便 面問圖 厥冷 **眼露白** 不食 **進始法五餘** 論部位

恋 起版辨症賦 見點遊症 起脹慢症 是整維症附 是第二日調治法 灰班丹疹艦 水痘 **发雜定剂** 熄泖 發航 五層指法 低滤 **灰**水痘 一日調治法 腹漏 日洞 見聽愛症 芝展 順 症 ガ人服

1-

七卷 **座娛雜症** 附 孫姓庭賦 紫黑泡 腹痛 挫候 作版 咳嗽 咽掮

彩 智部 **結加雜紅**斯 結痂姓症賦 結痂順症 飲食 腹脹而霜 倒屬 頭痛 中風 湯清 咳嗽 D 湖外

九祭 济失加 香迷鉛語 旭 游客 換鄉 唇口生療 湖流 痼痢 時感 痘頭不落 手足厥於 後湖治法 坐立戰衙 赤火流 尿 加 腹漏 秘紹 任

十一卷、聚為治法、聚為治法 十卷 信部 原症院出調治法 徐寿五節 麻症與後美辨 炼 遊初熱調治法 **沙姆出腹** 服目 麻症脚重 孕婦出族 麻症辨論

整語十方 嘔吐十一方 痘出不快 七方附治痘母諸失血症七方 大便砂結十九方 稀痕二十一方 山乾明崩十三方 喧氣不食三方 東集諸麻痘方 共計三百八十八方 **池**萬七方 小便不利五方 腹痛一方 日磨口臭牙班十五方喘急痰鳴咳嗽失苦一 發掘三方 頭痛身痛腰痛握痛九方 十五方

起灰白質三十二方 肥兒 接血活血 九方 虚火

不泥於書用其方而不執成方隨機觀變加減待宜方為良要臺灣藍藥以治病方隨症立切不可膠柱鼓瑟信其書的 階入親形察色審聲問症細細體察方知就裏若心相氣浮要小心蓋小兒不能言語又無六脈可憑其腹中之事全在 階 紫曆三要 汀起寧邑張 受業質衝波介統 **於遜玉氏編輯**

功並不誤 之不愈則堪驚貫亦不至於敗名熟與延醫之際為父母者 | 宋宜表補ツ 心如焚矣而故為迷說於心其何 切宜成之 小見樂在易出未幾海歸

之或症不起者亦少用之蓋能提清氣上行也 有汗或體弱者宜減之迷表虚也七日後寫不止者炒點用 方免後患故初發定 陽明經藥陽明主肌以欲痘之出必使肌肉疏通送 楊鬼府疾為止喉病兼治頭痛鼻吸口窓 球甘氣平性輕而浮陽色白而陳久者住 治解肌熱 止煩遏開提買氣與升麻同功惟處症 頭面多并有此潛島 用毎用五分至一錢直至出煙方止 们自办学

孤 九 心腹結氣治風寒發熱咳敷喘滿解的 | 咏哲微寒氣味俱輕陽也 正 頭痛散血痢鬱火 内執不退者宜重用之 **财苦氯微果** 引涛気行 腦病 嫩者住水洗去魔 道體處不敢過衰者官)断不可缺大有升水之功 ディ可復用 去濁月第水 外語熱去灰涎 治便

最發散活出汗泄衛中富去染中寒走次毛 實驗險症八九日尚無疑水者可用二三錢加附子數片質 致表處惟毒盛喘 消身熱療人 佰數分酒炒点服令出臭汗變為爛痘應可得生欲行此 必其人能食油病歷亮天庭庭有生意方可用也否則不 · 味辛甘氣温氣味俱薄陽也去根節、酒器全炒 味辛苦性温飲而上升陽也 很能止沃 起出 者宜暫用と若有

防風味甘辛氣温陽也 獨适味辛苦微温氣味輕陽也 後立去之、 **故下身出不透者用獨活二者供能與影雕不可缺然見點** 但遙氣雄其力廣陵上身出不透者用是活獨氣微而走足 理到頂難抒雨足胖濕散寒邪驅熱毒肚熱增寒落獨宜用、 **芜花解阳子毒** の下する

学門耗氣灌膿時不敢用 尿辛氮温輕而陽也 「病血病を家里変塩出」 治血炒黑月 菜性 c. 九日間跡 但止宜三四分 U

始終宜用惟嘔吐氣道者缺之兩部不思者當倍加之 以後我用稍止造中作搞節冶腫張譜矯生儿 · 一颗暖敷宜用、 **《炙用氣温·補元気而散表寒入和劑則補益》** 生能解黃美則温山故 一下引出藥於至尚之分以成功且養血排 **劑則寫邪熱人潤劑則養陰血自始至** 取北地者為住

称張運明 阪 閉風聚去浮腫乃信 名大九一名旗城珠辛苦氣平 風失聲小見夜暗

覆疆 宗辛 微温色 白者住以橋米州浸炒乾惡桑螵蛸伏神 隨性淫主因特陽交接不俗。治症作程亦解毒許暫用 消膀胱相火引清氣上朝于口遊近無頭治燒灰調酒服雄 主驚風痰壅昏悶失音四肢搖舉治療療物疾疾調酒服雄 劑中治除涉者亦宜用之但元為后者慎之、通經格入病態追羨非機引藥入腸腸透肌竹乃短不起者用數分子種山里味苦氣微寒炒黃色研末調服 **恆 遊 遊 遊 遊** 發煙穩起倒陷則宣唱翅足)經濟經消煙是甲之力更肽

原發越市易起不可過者恐大便利而重氣泄也於 原發越市易起不可過者恐大便利而重氣泄也於 原 是 山河 一 過 用 加 橋米 亦能發塩宜 用 光 原 地 と
の血除五心
を 1古気微寒陰中陽酒洗則上行品來放鐵器 毒几痘色乾紅 薬性

熟地直味甘而徽温性沉而降陰也用酒浸熬晒九次。 為腎水補真陰填骨髓生精血扶肾中元氣行補血養血防腎經發症無限而血虚者宜于補利中用之但其性恐病血素原血用大生地紅利用熱地直味了時經過過性沉而降陰也用酒浸熬晒九次 者飲之

D. 子後姓 是京府群理風掉頭癇痘後風疾手足。 以頭脛骨為住 断不可用 虎肚治反目、 群羽凰

地骨皮味甘淡而氣鴉 退即止,是既後身熱 一用但能散氣氣處者宜以用

迈和白水水掺之 州。 滑, 胎, 下胎

益特强除人 日兼有廢於省宜用之 丁越氣寒 山遊氣寒 《氣微寒升而能降 屋後水脈亦用 人膀胱以除熱利小便不 酒浸用总鉄 浮腫止吐瀉能祛去 川之火雁屋後亦用惟井

味淡甘辛系疾甚 為腫者宜用之人少和り腹疹 施後用氣虛者忌 石石焦唇肺初熱口具咬牙火斑水 氣血者是之痘後的拜口爛石亦 切氣化腹脹浮腫非此不除 一人账题用 高的宜选单級用

氣微寒 塞散腹中結號陽崩氣定大腸、 **行發起脹以氣傷至亦不敢用** 人性蒙治氣分以是初的胸口 (便不過而出不快茶宜暫用) 陳若住然此用 **运用而未请好** 1

方珍珠苦碱氣寒蒸過用是銅氣反黎蓝 明治 丁言 アクルー 這之初熟以至結脈供可用, 入脾脑調中快肠道 之水疾丹疹應者即不可飲烟時人制火盜精明日最利咽緊開於 出交廣 但多則損~

清心潤肺傷熱除 ·加氣而滋腎水除原土五味俱精 北庭 首於無温 食定捐安胎止此 北庭紫黑省住南 -如神神胃: 参方田木耳

在自解於不住勝殺巴豆毒 上魚火姜汁炒治中焦火鹽水炒治下焦火熟菊花玄经禮 是縣熱毒盛者必宜川之而兩類紅紫且很者尤不可飲惟 是縣熱毒盛者必宜川之而兩類紅紫且很者尤不可飲惟 是縣熱毒盛者必宜川之而兩類紅紫且很者尤不可飲惟 是縣熱毒盛者必宜川之而兩類紅紫且很者尤不可飲惟

積熟生疳積過去心熱益肝原 表然用皮、味苦氣寒 派苦氣寒、 生用傷水 足、用。 中。不 下。 行從。

芒者為在硝用硝大確火以成份為玄明粉 切實熟其力能扶但敢腸胃傷死氣症以調問以下級結而除疾熱光下刑與瘦止如血 日大胰其性走面不守,消制,亦能引于至高之大苦氣大寒。 山四川,錦紋者佳酒蒸九次川、 用也如大便不通不若未去油之豆裝 明物味辛苦大寒 少、一葉也 篇 勿 脛 武 之質就發展中之指步乃下藥之 硝之在成者為小在 于至高之分用以

宜用又能破參族之淵亦監御參族之品也健脾行滯消食去積發症排脹化痰散燃塩 家所是。 **見勝下氣消食去する** 川 消米麪果食之

水平甘氣温。 遊後手是抬寧軍首五 的脸 用 排膿痘必積血丛 一妙是清黃

心以能排膿化毒亦可止血血髓調和氣血消諸磨雞頭血脂,和氣血消諸磨雞頭血脂,

漫黃地 城 海肝而月自安制肝而胛乃健也是源法者生磨酒服其漏自止目見能治血凉血血散不收短量不見能活血凉血。 經過陽 紅如瑪瑙破 湯以 宜。而 版 血 。 他 血 。 业。 俱宜 倍用 則能够的

婚用事味甘碱性温即胞衣長流水洗淨酒蒸焙乾婚者非此不能起也任妻之劑安可飲乎、在看直不配生精益髓補血助陽强筋健骨乃枉浆之聖藥痘之灰自然 可治症倒陷 **用児或有病之婦其,胎有毒服之反致害人戒之** 無職補血助陽之有虫恐人鼻 乳白而稠者為 納甘草于竹倚塞孔浸糞缸中二三月取出

人参生甘若後涼熟甘而溫吳五靈脂惡息角大神元氣止海生海。高面領房退虛熱以升樂之和元氣止海生海。高面領房退虛熱以升樂之順、大神元氣止海生海。高面領房退虛熱以升樂之與此為其之極東。 煩止游熱而不恐事補肺氣熟流流 吐血便血 食。这。隨

闭 、林县 肺經生養患補氣最 議主は、鉄但さ 测。陰 性人熟氣上評而 以後宜回肌表乃宜炙用。元氣温三集實際理址理品元氣温三集實際理址理品 元,解 為三無實際理址脾胃生血生 , 放痘家於六日以前生人 南柱 开純陽之品 用。可

四肢腫痛及手足前攀者亦宜用之成是手足凡痘四肢不起者宜于補中用皮溫經通豚發汗解肌調和營衛使邪氣被溫經通豚發汗解肌調和營衛使邪氣。 Jik o 。哪 以場而善文歷点 明具 消

戦咳不灰白不起一切沉疴等症非此不原惟孕婦思之腑沉寒痼冷能使陰長陽生故痘家虚寒冷症嘔吐泄傷皮能消水腫 炮製黑薑毒能矮胃而守中定嘔消痰毒痰下食通神明去碳惡败暴卒殺好禽之毒除山風塵氣 是意味辛而性熱學養水暖料止此 可用 煨去油去油不净!

虚池。 也 | 冰苦酸性急生用清金行氣凝用温門門 还其用之但初熱順之 之以初形治的防電系 腸,

協削叶之時 後思又不可不慎也起唇舌轉紅即當去此凡下往菱附過用則指起唇舌轉紅即當去此凡下往菱附過用則指 能造張或尚中風寒而 別 功同附子而稍緩性能祛風飲痘後手足拘攣風瘦之 附子川島俱覧胎孕婦忌 · 氣温松根雲氣結成有亦白二色。 班利水但白者補心肥,亦者利濕熱俱能, 切處寒等症非此不能故原但不而面背唇白痘忽倒陷或氣血 東京型語敷型所用八九日間吸清皮障者。 家七八日前勿用八九日間吸清皮障者。 の神味二經補其不足清其虚熱固腸胃化 **决迎即获尽地根生者思识** 是若升水永足断不放用 是若升水永足断不放用 定者升水永足断不放用 以用惟收問之際不過率心安神定為 鼠茯苓同用 正宜用之

ĵ **经顺管上败化淡解渴除热治肺疸飲瘠口** 系被寒川產別例者任獨願無辨者不堪 、収給亦宜用之 洋液跡不敢用八九日後北省泉治痘中水泡之聖繁 質黃妮 和包果了 之聖然 L 加工風光則

世夏味辛而氣温有張監製及川島 中夏味辛而氣温有張監製及川島 敷之可以立愈處發來者亦用胆星然生者害散悉范克酸酸發行下氣利水脂胎性更烈于主 遊所以退腫毒群音较暴罕利水燥麥痘家

也、 加温 冷病然後服役 沙沙 築等的庫 薬性

天竺遺味甘而微寒胃南海大竹之津結成即竹內黄ీ 人及海家莫川、杏行氣秘桃至血秘,治界經濟與人,進大勝大血室行湍血破瘀血生新血治閉經病症有,然生皆甘而平,雙仁者不可用號花下宿水瘀風狂 清心灭去風熱利竅絡痰與肝明目功同村瀝而性 宣用去皮尖思古武造冷乾彩

線之 後痢 破血排體 郭斯斯 一出四川 電影以之為引 の所加引替施丁 城問 Ē

滑腸痘中莫用痘後陰虛火動者宜用之满肺金而瀉火澗腎燥而滋陰消疾定嗽止為肺舍亦氣寒而消 主候開閩浦止咳嗽氣逆 Ī

竹芝味苦辛性以簡 八肺經能止吐血肺傷損者可使復生治跌打 了妹子若而狹 杂化 反用鳥

沓而温北地有羊 澆血明目

血分 而微温 则心<u>人而</u>平肝木祛風除熱養自去翳痘 14水浸一宿用花木間 、隂分白者入場 E

宜、髮。 微果 一切日疾 处了。

食蚊砂 F

頻到味其氣平松脂入土年人往 以上痘後目疾備以選用 〈能明目志殿 人所與心消灰血生肌岛写心定殿 行頭頻腦鳴止 月淚睛痛推 食出痘必添 風凉血凡手口 1

效非凡藥之可比也且苦能解毒類家紫 陷點陷了其右世出漫麥少許立化為水治小兒繁循有起一萬七明學麥與許立化為水治小兒繁循有起一清心解熱定應安魂而辟邪解熱通家定驚化麥 (黃自吐水中為生黃有角黃肝黃胆黃 一有黃者肌瘦而毛潤多吼吸以盆乘 一聚處州水皆黃 以、四、品立、生、细之之。出

重面沉平用下氣為治驚利聚之聖藥。 八如反擘也切宜順之管事可以 獨逐迷目赤翳障痘家能起照陷入肺面通心胆走而不守逐情人 甘辛性大熱治痘風熱不遇引藥上行祛痰治中 陰祛風消痰治小。 有回天之力氣虛名而 風

一 飾心要發養血活血善治驚狂凡痘之心神不寧者無婦她性平如鏡面者住 定大人之類在完成一定心安观群等 其性善是能疎五臟通經絡之過性溫 尾平 善解毒能起痘之紫黑治小 荻丛 デベ

燥胃阻肺為除濕之聖雜燈之味甘辛性過而烈 夢遺驚悸症後心神忧惚者宜用之主心經兼通腎氣强志益智別應明而利, 開心利竅而除風濕然能散氣痘寒英川 題性温 尿苦辛性温去心用 羽魔痘之初中 忌用情水泡難屬海後浮腫宜用 学性温 6. 1 B

「味酸性温 盃血助 筋 散 療 法 風 補肝膽而醒脾爲本心之更藥 生精而功學去風朔見賢虚宜用)熟引相人下行通小

ø 通 能祛風伸 · 追這後欲潰疽宜用, 以立酥但痘中恐其散 而废精壮吗,

青心 葬而短中が 清熱殺重凉肝明 心血之 。這精必用

青丝一似实 經產之里藥 消水行血去<u>冰生新調經解</u> 準弱者宜用之 。 一种野菜骨能破血止血治衛 寫肝清熱散五雕之類人 心通腠理利九餘為下

四陸東、而有時、沉陰下行而療水腫 胎而損元氣不可妄施 鴻臟所水濕行血發汗泊十二水凡風毒µ腫宜用 腹端水腫宜用之 。疾而有詩 莱而有蒜 一醋煮用生温熟熟純陽之性 能引吐行水而祛

我儿 源 八心者宜用之 氣温 心初出 た病療 次肝管下氣吸血治禁 入肝經破血中之氣散血密破無中之血消瘀通經解食 同 THE STATE OF 州水省重

痛腎冷精流 大命門補押 天温 為清暑之 殺虫疥 們相大以通君火矮丹因此心主藥能利水而降熱也 除胖經濕熱治黃疸之君藥一便治黃疸疳積 **晓**族 猫肌

蛇床子性温 强陽症陰補營故程治班無理寒濕脚氣 能殺重煎水浴。 性溫酥炙用 丽 四山 、野經强、 、俗可去風痒 。 1 见症囊隔次 2 强隆盃精不助相 陰益精治五勞七傷 矮丹田壮元陽治陽氣不勝治五勢七傷埋風氣 源法风 元。随

新調經行血去瘀生新乃始。 不过果微热 血中氣藥通行氣脈 才能降泄肺 7 大苗入膀胱 亦能 如村骨者住 健胖矮 築性 氣疏野草 劑宜用 丹田補命門 三

交流 Júl. 日散寒治胃脘痛口避牙原 解弱能起痘)[A]。 [[連] 16.

施置有毒大跳純陽 補命門氣煙混器形狀純陽 利用地經濟學 正血的順収濕除爛退赤去! ! 性温殿紅蓮便容七次 平 下 经肌續絕治避疽瘡腫 之、精

利的。 層別語 能收敛元 通 ,加. 必而上行人 心脂肪固精 18117 緊內治 吐血 则流 疽瘡而令 **吐麥延而立** 自然初 陰。 ・殊。

八大宗 人肺八人性温而氣雄 人排腺生肌治療生 寒而有声 潰肉塵 生则止血解毒 **增赤纖腫** 公宿血生新血安生脂質 脂通經提效

氟行 補肥 行氣 血·寒 词 能補史 血分 飲則傷神起血動火生液

和補藥可以顧而來故腎 膀胱而利 風。胛 黑不宜用雞冠血可攻痘房 M **- 題場所得大勝 家**莫用麻疹無妨 之火而明¹ 虚嗷 伊可怕膠 1 册

越微寒 福温. 風炉 一被温 犻 温. 潤肺凉心利次 清帐生律核歷以水點與 海 系 善于収牆縮小便治白濁 惱腸潤肺清上焦芯肺 能清陽上傷治用帯脫肛

時心可強座後血湯 血氣症發能發度療 灰合薬 助脾胃而出 河滴 補胖胃滴大 A.TH.